

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Hungária Kft. (1123, Budapest, Alkotás u. 50.)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: KVP, Pharma + Veterinär-Produkte GmbH, Kiel, (Németország)

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Advantage 40, rácsepegtető oldat kistestű macskáknak és nyulaknak A.U. V.

Advantage 80, rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak és nyulaknak A.U. V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Az Advantage rácsepegtető oldat 10% imidaklopridot tartalmaz.

1 cseppentő pipetta tartalmaz:

	Egységnyi adag	Imidakloprid
Advantage 40, rácsepegtető oldat kistestű macskáknak és nyulaknak (≤ 4 kg)	0,4 ml	40 mg
Advantage 80, rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak és nyulaknak (>4 kg)	0,8 ml	80 mg

Antioxidáns: butil-hidroxitoluol

4. JAVALLATOK

Macskák bolhásságának megelőzésére és kezelésére, ezáltal a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (FAD) megelőzésére, illetve a gyógykezelés részeként.

Nyulak *Ctenocephalides felis* okozta bolhásságának kezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

8 hetesnél fiatalabb macskán alkalmazása ellenjavallt.

10 hetesnél fiatalabb nyúlön alkalmazása ellenjavallt.

6. MELLÉKHATÁSOK

A termék keserű ízű. Esetenként előfordulhat nyáladás, ha a macska a kezelés után azonnal nyalogatja a kezelés helyét. Ez nem mérgezési tünet, és kezelés nélkül néhány percen belül megszűnik.

Nagyon ritkán enyhe átmeneti bőrtünetek (pl.: az alkalmazás helyén viszketés, kipirosodás) emésztőszervi-, (pl.: hányás, nyálzás) esetleg idegrendszeri tünetek (pl.: remegés, ataxia) előfordulhatnak.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK


Macska, nyúl.

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓDOK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Az ajánlott minimális adag 10 mg/ttkg imidakloprid, ami megfelel 0,1 ml/ttkg „Advantage macskáknak és nyulaknak” készítménynek.

Macska és nyúl testtömege (kg)	Termék	Pipetták száma	mg / ttkg
≤ 4 kg	Advantage 40, rácsepegtető oldat kistestű macskáknak és nyulaknak	1 x 0,4 ml	min. 10 mg
4 - 8 kg	Advantage 80, rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak és nyulaknak	1 x 0,8 ml	max. 20 mg
8 kg feletti testtömeg esetén az Advantage 80 rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak és nyulaknak készítmény 2 pipettáját (0,8 ml) kell használni.			

Egyetlen kezelés kb. 4 hétig megelőzi az újr fertőződést macskáknál, és egy hétig nyulak esetében.



A macskán élősködő bolhák 1 napon belül elpusztulnak.

A környezetben már meglévő bábok 6 vagy több héttel a kezelés után is kifejlődhetnek a környezet klimatikus viszonyaitól függően. Ezért szükséges lehet az Advantage kezelést kombinálni olyan szerrel, amely hatásos az állat tartózkodási helyén előforduló fejlődési alakokra és így megállítani a bolhák élelciklusának környezetben zajló részét. Ez a lakókörnyezet bolhafertőzöttségének gyorsabb megszűnését eredményezheti. A terméket havonta kell alkalmazni, amennyiben a bolhaallergiás dermatitis kezelésének részeként használják. Megázás a szer hatékonyságát nem befolyásolja.

9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Alkalmazás módja


Vegyen ki egy pipettát a csomagból. Tartsa a pipettát álló helyzetben, kupakkal felfelé, és csavarva húzza le a biztonsági kupakot. A kupakot fordítsa meg, nyomja rá a pipetta végére, és csavarva húzza le.



Macskán és nyúlra való alkalmazás:

A tarkón, a koponya alapjánál hajtsa szét a szőrt úgy, hogy a bőr láthatóvá váljék.

Érintse a pipetta hegyét az állat bőréhez, és többször erőteljesen nyomja össze a pipettát, amíg a teljes tartalma a bőrre kerül.



A tarkótájékra juttatva az állatnak minimális esélye van a készítmény lenyalására.

Csak ép bőrfelületre juttassuk a készítményt. Ne engedjük, hogy a frissen kezelt állatok egymást nyalogassák.

10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt nyulak kezelésére nem engedélyezett.


11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Ez az állatgyógyászati gyógyszerkészítmény különleges tárolási körülményeket nem igényel.

Lejárató idő 5 év

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.



12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Különleges figyelmeztetések az állatokon való alkalmazáshoz

Legyengült, idős, vemhes vagy szoptató állat kezelése esetén, ha az állat egyéb gyógykezelésben részesül, a kezelés előtt az állatorvossal konzultálni kell. Kerüljük a szernek az állat szemébe jutását. Ha a szer figyelmetlen kezelés következtében az állat vagy ember szájába kerül, mozgászavart, remegést, görcsöket okozhat. Aktív szén adásával a mérgezés tünetei enyhíthetők, melyeket tünetileg kell kezelni. Specifikus antidótum nem ismeretes.

Csak külsőleg alkalmazható!

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

Nagyon ritka esetben, mint helyileg alkalmazandó szernek a használata után előfordulhatnak egyedi bőrtünetek (pl.: allergia, bőrirritáció). Meg kell akadályozni, hogy a készítmény szembe, szájba kerüljön. Ha véletlenül a készítmény a szembe kerül, bő vízzel ki kell öblíteni. Ha a bőr vagy szem érzékenysége huzamosabb ideig fennáll, vagy a készítményt véletlenül lenyelték, orvoshoz kell fordulni és a készítmény használati utasítását bemutatni. Ismerten érzékeny bőrű emberek a termékre különösen érzékenyek lehetnek.

A felhasználónak:

A készítmény oldószere egyes anyagokon, pl. műanyag, bőrön, kárpiton stb. foltot hagyhat. A lejáratú időn túl nem alkalmazható. Élelmiszertermelő állatok a szerrel nem kezelhetők. Takarmánytól, élelmiszerektől elkülönítetten kell tárolni.

Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás

Patkányon imidaklopridral végzett vizsgálatokban nem találtak elsődleges embrió-toxikus hatást. Patkányon és nyúlra teratogenitásra és reprodukcióra utaló hatást nem tapasztaltak. Vemhes és kölykeit szoptató szukákkal végzett vizsgálatok korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az eredmények azt támasztják alá, hogy nem kell nemkívánatos hatásra számítani ezeken az állatokon.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók

A készítmény ajánlott adagjának kétszeresét alkalmazva a következő általános gyakorlatban használt állatorvosi termékekkel kompatibilis volt: fention, lufenuron, milbemycin, febantel, pyrantel, praziquantel. A készítmény kompatibilitását sok, gyakorlati körülmények között rutinszerűen alkalmazott kezeléssel (vakcinázást is beleértve) bizonyították.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidótumok)

Macskáknál nyolc héten keresztül, heti egy alkalommal, a terápiás dózis 5-szörösével kezelve nemkívánatos hatás nem volt megfigyelhető.

Nyulaknál nemkívánatos hatás nem volt megfigyelhető négy héten keresztül heti 45 mg/ttkg dózis (4-szeres terápiás dózis) esetén.

A véletlenszerű szájon át való felvétel utáni mérgezés valószínűtlen. Mérgezés esetén állatorvosi felügyelet mellett tüneti kezelést kell alkalmazni. Specifikus antidótum nem ismert, de aktív szén adása jótékony hatású lehet.

Főbb inkompatibilitások

Nem ismeretesek.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladékanyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2011. november 30.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjához:

Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Tel: 06 1 487 4100, Fax: 06 1 487 4121, e-mail: allatgyogyszer@bayer.com

15.1. Rendelhetőség

Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra.

15.2. Forgalmazhatóság

Szabadon forgalmazható.



15.3. Kiszerezési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság

Advantage 40, rácsepegtető oldat kistestű macskáknak és nyulaknak (<4 kg)

Kiszerezés: 0,4 ml cseppentő pipettánként.

1 vagy 4 darab egyadagos cseppentő pipetta buboréksomagolásban.

A tartály anyaga: fehér polipropilén egyadagos cseppentő pipetta csavaros zárókupakkal.

Advantage 80, rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak és nyulaknak (>4 kg)

Kiszerezés: 0,8 ml cseppentő pipettánként.

1 vagy 4 darab egyadagos cseppentő pipetta buboréksomagolásban.

A tartály anyaga: fehér polipropilén egyadagos cseppentő pipetta csavaros zárókupakkal.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezési egység kerül kereskedelmi forgalomba.

16.4. Törzskönyvi szám

2486/3/09 (4 x 0,4 ml) MgSzH ÁTI

2486/5/09 (1 x 0,4 ml) MgSzH ÁTI

2487/3/09 (4 x 0,8 ml) MgSzH ÁTI

2487/5/09 (1 x 0,8 ml) MgSzH ÁTI

